골반 방사선 치료후의 골 변화와 손상

성균관대학교 의과대학 삼성서울병원 방사선종양학교실

허 승 재

방사선치료후 발생할 수 있는 골 손상은 골반 부전골절, 방사선 골 괴사, 무혈성 괴사, 골 육종 등이다, 특히 최근 방사선치료후의 골탄성도의 변화로 발생하는 골반 부전골절에 관하여 많은 보고가 있었다. 과거 방사선치료 후의 골 손상 특히 골절의 빈도는 선형가속기를 이용한 메가볼트 방사선치료 바뀌면서 현저히 줄어 들어서 매우 낮은 것으로 보고 되었으나 최근에는 8~20%로 보고가 되고 있다. 따라서 골반 부전골절의 임상적 의미와 중요성과 예방 및 치료에 대하여 관심이 증가되고 있다. 저자는 자궁경부암 치료 후 관찰한 골반 부전골절, 골 괴사, 무혈성 괴사, 및 2차성 골육종등 골반골 변화와 손상에 관하여 저자의 경험과 문헌고찰을 통하여 보고 하고자 한다.

핵심용어: Pelvic insufficiency fracture, Osteoradionecrosis, Post-radiotherapy osteosarcoma

서 론

방사선 치료후 골 변화와 손상은 과거 킬로 볼트 방사선 치료에서 선형가속기를 이용한 메가 볼트 방사선치료로 바뀌면서 현저히 줄어 들었다. 방사선치료후 발생할 수 있는 골 손상은 골반 부전골절(Pelvic insufficiency fracture: PIF), 방사선 골 괴사(Osteoradionecrosis), 무혈성 괴사(avascular necrosis), 골 성장 장애, 골 흡수(osteolysis), 골 육종 등이다.^{1~5)} 특히 1982년에 Lourie⁶⁾ 의하여 “spontaneous osteoporotic fractures of the sacrum”이 보고된 이후 폐경후 골다공증 환자나, 스테로이드 사용과 방사선치료후의 골탄성도의 변화로 발생하는 PIF에 관하여 많은 보고가 있었다.^{1,2,6~14)} 과거 방사선치료 후의 골 손상 특히 PIF와 골절의 빈도는 매우 낮은 것으로 보고 되었으나,^{7~11)} 최근에는 8~20%로 보고가 되고 있다.^{1,12~14)} 또한 자궁경부암 골반 부 방사선 치료후 발생하는 PIF 빈도에 관하여 영상의학적으로 골격계 진단에 매우 유용한 MRI와, 골 주사 등에 의한 체계적인 연구 보고에 의하면,^{2,15,16)} 34~89%로 높은 PIF의 영상의학적인 소견이 관찰된다고 보고 되고 있다. 아울러 PIF의 임상적 의미와 중요성과 예방 및 치료에 대

하여 최근 관심이 증가되고 있다.¹⁴⁾ 임상적으로 특히 중요한 것은 골 전이와의 감별이 필요한 경우이다. 그러나 아직 방사선 종양학 관련 중요 교과서에서도 이 분야에 대하여 기술이 되어있지 않다. 저자는 자궁경부암 치료후 관찰한 PIF, 골 괴사, 무혈성 괴사, 및 2차성 골육종등 골반골 변화와 손상에 관하여 저자의 경험과 문헌고찰을 통하여 보고 하고자 한다

1. 골반 부전골절(Pelvic insufficiency fracture: PIF)

1) PIF-정의와 발생빈도

PIF는 일종의 피로 골절로서 광물질소실(demineralization)과 탄력성 감소로 약해진 골에 정상적인 또는 생리적인 스트레스 의하여 발생된 골절이다(Fig. 1). 주로 우리 몸의 체중을 지탱하는 천장관절(sacroiliac joint) 부근의 천골익(sacral ala)에서 호발 한다(Fig. 2).^{1,2,9~13,17)} PIF는 폐경후 환자에서 주로 발생하며 고용량 스테로이드 사용 환자나 류마티스 관절염 환자에서도 발생이 된다.^{18~20)} 즉, 골 조직 생성이 감소 되고 흡수가 증가되어 골조직의 손실된 경우에 발생한다. 따라서 방사선치료 특히 폐경후 환자로서 골다공증이 심한 경우에 발생한다. PIF는 인구고령화로 노인층의 방사선 치료가 증가하여 더욱 늘어 날 것으로 생각 된다. 방사선 조사는 골조직에 직접적으로 작용하고 혈관계에 간접적으로 작용하며,²¹⁾ 방사선조사 후 골아세포의 감소와 콜라겐 생성과 알카라인 포스파테이즈를 감소 시켜서 무기질침착(mineralization)의 감소로 골감소를 초래

이 논문은 2009년 2월 9일 접수하여 2009년 2월 10일 채택되었음.
 책임저자: 허승재, 삼성서울병원 방사선종양학과
 Tel: 02)3410-2601, Fax: 02)3410-2619
 E-mail : sjhuh@skku.edu

Fig. 1. Schematic illustration of insufficiency fracture. Insufficiency fracture is one of the stress fractures which occur when the elastic resistance of bone is inadequate to withstand the stress of normal or physiological activity. On the other hand, fatigue fracture occurs in the normal bone due to the abnormal stress.

Fig. 2. Schematic shows distribution of insufficiency fractures in the author's series.¹⁾

한다.²²⁾ 또한 방사선 조사 후 미세혈관 폐색로 인하여 PIF의 발생 가능성이 증가한다.

2005년 Baxter 등은¹⁴⁾ 65세 이상의 노인에서 골반부 방사선치료를 받은 항문암, 자궁경부암, 직장암에서 골반 골 골절 빈도를 각각 14, 8.2, 11.2%로 보고한 바 있고 이는 방사선치료를 시행하지 않은 군에서의 발생빈도 7.5, 5.9, 8.9%에 비하여 의미 있는 증가라고 기술하였으며 최근 항암 화학요법과 방사선치료의 병합요법으로 골반골절의 증가 위험성에 대하여 주의를 하고 있다. 많은 저자들에 의하여^{1,2,6~17)} 방사선치료 후 PIF에 관하여 최근 10여년간 발표되었으며 초기에는 메가 볼트 방사선치료로는 매우 드물다고 보고되었으나,^{7~11)} 최근에는 8~20% 정도로 보고되고 있다.^{1,12~14)} 저자도⁸⁾ 2000년에 PIF 발생빈도를 1.7% (8/463)를 보고했으며 이후 더욱 주의 깊은 임상 추적관찰과 체계적인 영

Table 1. Incidence of Pelvic Insufficiency Fracture after Pelvic RT for Cervical Cancer

Author	Incidence	Comment
1. Ogino et al ¹²⁾	17%	
2. Ikushima et al ¹³⁾	13%	5 year cumulative
3. Abe et al ¹⁵⁾	34%	Bone scintigram series
4. Blomlie et al ¹⁶⁾	89%	Prospective MRI study
5. Oh & Huh ¹⁾	20%	5 year cumulative
6. Baxter ¹⁴⁾	8.2%	older than 65 years

상의학적 검사, 즉 매년 MRI와 골 주사 등을 시도하여 2008년에는 19.7% (83/557 5년 누적치)를 보고 하였다 (Table 1).¹⁾ 1996년에 발표된 Blomlie 등에¹⁶⁾ 의한 전향적 연구 즉 MRI를 통한 자궁경부암 환자의 방사선치료 후 3개월 간격으로 30개월까지의 MRI 추적검사에 의하면 18명중 16명에서 즉 89%에서 PIF 소견을 볼 수 있었다 한다. 또한 Abe 등은¹⁵⁾ 골 주사와 CT로 추적 관찰한 결과 34%에서 PIF를 관찰하였다고 보고하였다. 저자 등도 1998년 부터 2005년 까지 방사선 치료를 시행한 자궁경부암환자의 510례의 MRI를 영상의학과 전문의 2인이 후향적 판독을 통하여 100례에서(누적 5년 빈도 45%) PIF에 일치하는 소견을 보고하였다.²⁾ 발생시기는 86%가 방사선치료후 2년 이내에 발생되었고 그 범위는 5~44개월(중앙값 13개월)로 저자는 보고하였으나 MRI 추적검사로는 1~87개월 사이에서 관찰되었다.^{1,2)}

2) 호발부위와 관련인자

PIF의 호발부위는 천장관절과 연한 천골익이다. 타 병소와 동반 경우도 천장익에서 제일 많고, 관골(acetabulum) 이나 치골(pubis), 요추에서도 발생하지만 주로 천골익과 동반하고 이는 천골이 우리 몸의 체중을 지탱하는 중요 부위이며 이곳에 많은 힘이 가해지기 때문이라고 설명하고 있다.^{16,23)} PIF는 체중이 직접 전달되는 천골에 우선 생기고 천골익에 수직 또는 비스듬한 골절이 발생한 후 스트레스가 증가하면 횡 천골 골절 발생한다(Fig. 2, 3). 저자들은 MRI를 이용한 후향적 분석을 통하여 PIF의 다발성을 61%에서 관찰 하였고 이중 40%가 천골익의 양측성 병변이었다. Cabarrus는²⁴⁾ 다발성을 70%로 보고 하였다. 처음에는 단일 병변이어도 이후 28%에서 다발성으로 변화 한다.¹⁾

PIF에 관여하는 인자로는 나이가 가장 중요한 인자이다. 저자의 연구에서¹⁾ 55세 이상에서 PIF의 발생은 31.8%로 55세 이하의 8.5%에 비하여 현저히 높았다. Ogono, Baxter 등도^{12,14)} 같은 보고를 하고 있다. 또한 Blomlie 등도¹⁶⁾ PIF는 95%가 폐경후 연령에서 관찰되었다고 보고하였다. Ogino는¹²⁾ 저체중(49 kg 이하)과 출산력이 3회 이상인 경우

더 많이 발생한다고 하며 저자들도 55 kg 이하에서 많이 발생함을 보고하였다.¹⁾ 이외에도 스테로이드 사용, 갑상선 기능 항진증, 류마치스성 관절염등이 위험인자로 알려져 있으며, 항암방사선병용치료가 방사선치료 단독에 비하여 PIF의 발생빈도를 높혀 주는가에 대해서는 별로 보고가 드물지만 가능성이 있다고 보고된 바 있다.^{25,26)} 저자 등의 보고에 따르면 cisplatin 을 주축으로 한 항암 방사선치료로서 PIF의 발생빈도는 방사선치료 단독군에 비하여 차이가 없음을 보고 하였으나, 이는 추후 지속적인 연구가 필요한 분야이다.

3) 증상과 임상적 특징

PIF의 증상으로는 약 반수의 환자에서는 증상 없이 발견되지만 나머지 반수에서는 골반의 통증을 호소한다.¹⁾ 그러나

대부분의 통증은 경미하며 3~4주정도가 보통이다.^{6,12,14,15,20)} 그러나 심한 통증과 마약성 진통제나 입원가료가 필요한 경우는 저자의 경험에 의하면 13% 정도 이었다.¹⁾ Blomlie 는¹⁶⁾ MRI에서 1 cm² 이하의 병변은 통증이 없음을 보고한 바 있으며, 저자의 보고에 따르면 증상을 호소한 경우는 주로 다발성 병변에서 관찰되었다.¹⁾

PIF의 임상적 중요성은 골반 골의 전이성 병변과의 감별 진단이다. 특히 전형적인 영상의학적 소견이 안보이는 경우 골 전이와의 감별이 필요한 경우가 있는데, 일반적으로 방사선 조사야 내의 골 전이는 3% 미만으로^{15,16)} 매우 드물지만 골 전이와의 감별이 필요하고, 또한 골 전이와 PIF가 공존하는 경우도 있다. 저자도 이러한 골 전이와 PIF가 골 반내에 동시에 관찰된 증례를 경험하였으며 신중한 감별 진단이 필요하다.

4) 영상진단

PIF는 단순 촬영으로 매우 알기 어렵다. 방사선에 의한 염증반응이 혈관, 신경조직, 골세포에 나타나서 골절이 되는 것으로 방사선골염(radiation osteitis)이 기술되었다.²⁷⁾ 방사선에 의한 이러한 소견은 단순촬영과 CT에서^{27,28)} 보고되었다. 골주사로써 PIF가 대칭성인 경우에 H 또는 나비모양을 보인다. 그러나 이러한 PIF에 특징적인 H-sign은 10% 정도에서만 관찰된다(Fig. 4).²⁹⁾ 골주사는 매우 민감한 검사이지만 비특이적이다. CT에서는 골절을 볼 수가 있으며 이때 PIF에서는 골흡수 병변이나 연부조직 종괴를 보이지 않는다는 점이 전이성 병변과의 감별점이다.¹⁷⁾ MRI는 초기의 골변화를 진단하는데 매우 예민한 검사이며 골절을

Fig. 3. Insufficiency fractures in both sacral ala in 70 years old women 12 months after radiation therapy for cervical cancer. T2-weighted image (A) shows high signal intensity, T1-weighted image (B) shows low signal intensity, and T1 enhanced image (C) shows low signal fracture line in the both sacral ala.

Fig. 4. Bone scan showing H-shaped hot uptake in both sacral ala and sacrum.

Fig. 5. Radiation absorption dose to sacrum can be reduced by the intensity modulated radiotherapy or four field compared with simple parallel opposing fields.

잘 볼 수 있다(Fig. 5).^{2,24)}

Cabarrus 등은²⁴⁾ PIF진단에 MRI와 CT의 유용성에 대하여 비교 연구한 결과 MRI는 99%에서 CT는 69%에서 골절을 발견 할 수 있었다고 보고 하면서 특히 대퇴골 두부와 관골의 PIF진단에 유용하다고 보고하였다. MRI는 PIF의 진단과 추적검사에 매우 유용하다.¹⁶⁾ 저자들은²⁾ T2 강조 영상과 조영증강 T1 강조 영상을 이용해서 진단하였으며 특히 T1 조영증강 영상은 골절을 보는데 유용하였다. 또한 PIF를 보기위해서는 STIR (short-tau inversion-recovery) 영상이 가장 적절한 방법으로 보고되었다.¹⁶⁾ 골전이와 감별을 위하여 생검을 하는 경우가 있으며 이때는 조직학적으로 출혈, 섬유화, 괴사 골조직을 관찰할 수 있으나 골절의 위험성과 진단의 유효성이 낮아서 생검은 요망되지 않는 경우가 많고, 영상의학적 검사와 임상코스의 관찰 등으로 진단 해야 하는 경우가 많아서 PIF에 여러 가지 임상적 특징에 관하여 파악 할 필요가 있다.^{17,30)}

5) 방사선치료와 PIF

Emami 등은³¹⁾ 성인 하악 골에서의 방사선괴사를 초래하

는 내선량(tolerance dose) (TD5/5~TD50/5)을 60~77 Gy로 보고하였으나, PIF에 관하여는 내선량은 아직 보고된바 없으나 40 Gy 이상이면 발생한다.²⁸⁾ 방사선치료에 의한 합병증은 방사선치료 선량과 조사야 크기와 비례함은 잘 알려져 있다. PIF의 발생도 선량과 조사야와 관계가 있다. 통상 외부 방사선치료시 골반에 45~50 Gy 조사로 발생가능성이 있다. 저자들은 2문 치료에 비하여 4문 치료시 각각 36%와 17%로 4문치료시 발생이 줄고 50 Gy 이상 이하에서도 22%와 2%의 발생빈도의 차가 있음을 보고 하였다. Fu 등은²⁸⁾ 강내치료 선량은 중심선량의 10%정도가 천골에 흡수된다고 보고한 바도 있으나, 고선량을 치료시 이 정도의 선량증가가 어느 정도 발생 위험에 기여 할지는 확실치 않다. 방사선치료는 단순한 2문 조사보다는 4문 조사 또는 CT를 이용한 3차원 조형 치료로서 가능한 한 천골의 방사선 조사량을 줄여 줄 필요가 있으며, 최근 강조조절 방사선치료가 시도되기도 한다(Fig. 6).³²⁾

6) 예방 및 결론

PIF의 위험을 줄이기 위해서는 bisphosphonate, 비타민-D

Fig. 6. Osteolytic lesion in the right ilium on CT scan 3 years after chemoradiotherapy for recurrent cervical cancer in the pelvic side wall, proved osteonecrosis by a CT- guided bone biopsy.

등 약제로서 골다공증을 치료하는 것이 필요하며 특히 노인과 저체중 환자에서 필요하다.³¹⁾ 또한 방사선치료를 골반에 받은 환자는 과격한 운동을 피하여야 한다. 방사선 보호제인 amifostine (WR2721)도 시도 할 수 있으며 동물 실험에서 골밀도의 호전을 보여 주었다는 보고도 있다.³⁴⁾

결론적으로 방사선치료 후 PIF의 발생 빈도는 과거 실제보다 저 평가 되어 왔으며 골 전이성 병변과 감별이 필요하다. 따라서 방사선종양학과 의사로서 PIF에 대하여 숙지할 필요가 있으며 입체조형 치료 등 방사선치료 방법 등의 개선에 대하여 이를 줄여야 할 필요가 있으며 고위험성 군인 폐경후 환자에 대하여서 bisphosphonate 등의 약물치료가 필요하다.

2. 방사선 골 괴사(osteoradionecrosis: ORN)

ORN은 메가볼트 방사선 치료로서 이전에 비하여 많이 줄어 들었으며 골반 방사선 치료후 발생빈도는 0.44%정도라고 보고되고 있다.³⁵⁾ Wong 등에³⁶⁾ 의하면 ORN는 방사선에 의한 허혈성 괴사로 인하여 골조직의 괴사를 초래한 것으로 조사된 골에 골흡수성 병변을 보인다고 정의하고 있다. Emami 등에³¹⁾ 의하면 대퇴골두를 기준으로 TD5%와 TD50%를 각각 52, 65 Gy로 보고하고 있으나 골반골에서는 아직 보고가 없다. ORN와 골의 원발종양 또는 전이성 종양의 감별의 필요한 경우가 있다(Fig. 6). 이들은 방사선학적 소견이 비슷한 경우가 있고 PET검사에서도 ORN에 염증성 병변이 있으면 위양성 병변으로 나타날 수 있음을 염두에 두어야 한다.^{37,38)} 그러나 과거 방사선치료 조사야에

발생한 병변에 조직 생검을 시행시는 주의가 필요하며 CT 유도하의 조직 생검이 필요하다. ORN의 치료는 보존적치료가 일반적이고 때로는 수술이 필요한 경우도 있다.³⁵⁾ 고압산소 치료를 시도 할 수도 있다고 보고 되었다.³⁹⁾ ORN를 예방하기 위해서는 3차원입체 조형치료 또는 IMRT 등의 치료방법이 요망된다.

3. 대퇴골두 무혈성 괴사(avascular necrosis of femoral head: AVNF)

AVNF는 혈액순환의 장애로 인한 골괴사이며 원인은 골절 과거력, 알코올 중독, 스테로이드 치료, 항암화학요법, 외부 방사선 조사 등이^{3,40~44)} 알려져 있다. 대퇴골두는 포면에 혈관이 지나지 않는 관절연골로 덮여 있어 혈액이 제한된 부분을 통해서만 공급되고 측부순환이 제한되어 있어 무혈성 괴사가 흔한 곳으로 알려져 있다. 발생기전 가설 중 대표적인 것은 혈관내피 세포의 기능저하로 혈액의 응고작용으로 원위부의 국소 허혈이 생기면서 골세포들의 괴사로 골구조가 유지되지 않게 된다는 것이다.⁴⁵⁾

자궁경부암이나, 직장암에서 골반부 방사선치료시 대퇴골두 일부가 방사선 치료조사야에 포함 된다. 골에 방사선 조사시 일어나는 골의 변화는 골 위축과, 골소주가 얇아지며 그 속의 골세포는 골소강(lacuna)으로부터 사라지게 되고, 골아세포(osteoblast)나 파골세포(osteoclast)도 종종 보이지 않게 된다. 또한 많은 골수 공간이 섬유화되며 미세혈관에 혈류장애를 일으켜 이로 인한 골두부의 미세혈류장애가 골세포의 괴사를 유발할 수 있는 것으로 생각된다. 방사선치료 후 AVNF 대한 정확한 발병률에 대하여 보고는 매우 드물다. Grigsby 등은 부인과 질환으로 서혜부를 포함한 전골반 방사선치료를 받은 환자 207명 중 10명(4.8%)의 환자에서 대퇴골 골절이 나타났다고 보고한 바 있다.⁴⁶⁾ 이 경우는 방사선치료 범위에 서혜부가 포함되어 방사선에 노출된 대퇴골의 영역이 일반적인 전골반 방사선치료에 비하여 넓었기 때문에 발생빈도가 높은 것으로 생각된다. 저자도 최근 자궁경부암으로 전골반 방사선치료를 받은 총 557명의 환자들 중 2명에서 AVNF가 발생하여 0.4%의 발병률을 보고한 바 있다.³⁾ 두 환자 모두 방사선치료 후 1년 이내에 발생하였다(Fig. 7).

AVNF의 진단에 단순 방사선 소견으로 병의 진행 단계 및 정도를 알아내기는 용이하지 않으므로 MRI가 요망된다.⁴⁷⁾ 대퇴골두는 혈액순환 장애에 민감하여 괴사 가능성이 높은 부위로 전골반 방사선 치료시 드물지만 AVNF가 유발될 수 있으며, 방사선치료시 적절한 차폐로 대퇴골두의 선량을 최소화하기 위한 노력이 필요하며, 추적 검사시

Fig. 7. Simple pelvis X-ray (A) and bone scan (B) showing increased bony density, radiouptake of left femur head, and narrowing of joint space in a patient with cervical cancer 27 months after post radiotherapy.

Fig. 8. T1-weighted MRI and bone scan show bony lesion involving sacrum and both iliac bone, which was proved osteosarcoma histologically occurring 16 years after radiotherapy for cervical cancer.

이에 대한 인식이 필요하다.

4. 방사선치료후 골육종

방사선은 2차암의 위험을 높이는 것으로 알려져 있으며, 그 중 골육종은 방사선치료 후의 심각한 만기 합병증 중 하나이다.^{48,49)} 방사선치료를 받은 5년 생존자 중 0.035%에서 골육종이 발생하며, 8~15.5년의 긴 잠복기를 가지는 것으로 알려져 있다.^{50~52)} 이처럼 낮은 발생율과 긴 잠복기로 인해 방사선치료 후 골육종은 임상 의사들에게 널리 알려져 있지 않으며, 완치의 가능성이 있는 상황에서도 골전이로 오인되어 고식적으로 치료를 받게 될 가능성도 있다. 저자도 자궁경부암 방사선치료 후 16년과 8년 후에 방사선 치료 조사야내에서 발생한 골육종을 보고한 바 있다(Fig. 8).⁵⁾

1948년 Cahan 등은 방사선 후 골육종의 진단 범주를 보

고하였는데, “1. 최초에 골상태가 정상이었음을 증명하는 현미경적 또는 영상학적 증거가 있을 것, 2. 방사선이 조사된 뒤에 해당 영역에서 육종이 발생할 것, 3. 골육종의 임상 발현에 앞서 상대적으로 긴 무증상 기간(5년)이 있을 것, 4. 모든 육종은 조직학적으로 증명되어야 함.” 등이다.⁵³⁾ 방사선후 골육종의 영상학적 소견으로 연부 조직 종괴, 골 파괴, 중앙 기질 무기질 침착과 골막반응 등이 있다.^{51,52)} Nakasihi 등이 보고한 5명의 증례에서는 모두 방사선 조사 영역의 변연에서 골육종이 생겼는데, 이러한 곳에서는 선량의 분포가 상대적으로 낮으며 불균등하기 때문에 세포의 사멸까지는 유발하지 않으면서 세포의 손상과 변이를 유발할 가능성이 있다고 한다.⁵¹⁾

방사선후 골육종의 예후는 대개 불량하여 중앙 생존기간이 8~13.5개월로 보고되고 있다.^{54~56)} 가능하다면 수술적 절제만이 완치 가능하며, 절제 가능성은 종양의 부위와

관련이 있어 사지와 두부, 안면부에 비해 몸통에서 예후가 나쁜 것으로 알려져 있다.^{55,56)} 방사선치료후 골육종은 드물지만 심각한 만기 합병증으로, 조기에 진단하기 위해 좀더 주의 깊은 관심이 필요하며, 완치를 목적으로 한 수술적 절제를 고려하는 것이 필요하다.

참 고 문 헌

- Oh D, Huh SJ, Nam H, et al. Pelvic insufficiency fracture after pelvic radiotherapy for cervical cancer: analysis of risk factors. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 2008;70:1183-1188
- Kwon JW, Huh SJ, Yoon YC, et al. Pelvic bone complications after radiation therapy of uterine cervical cancer: evaluation with MRI. *AJR* 2008;191:987-994
- Yu J, Huh SJ, Park W, Oh D, Lee JA. Two cases of avascular necrosis of the femur head after whole pelvic radiation therapy for the treatment of cervical cancer. *J Korean Soc Ther Radiol Oncol* 2008;26:126-130
- Lee JA, Huh SJ, Oh D, Bae DS. Osteoradionecrosis after three-dimensional conformal radiotherapy for recurrent cervical cancer presenting as a progressive osteolytic lesion. *Ann Nucl Med* 2008;22:139-141
- Noh JM, Huh SJ. Two cases of post-radiation osteosarcoma of the sacrum after pelvic irradiation for uterine cervical cancer. *Eur J Gynaecol Oncol* 2007;28:497-500
- Lourie H. Spontaneous osteoporotic fracture of the sacrum: an unrecognized syndrome of the elderly. *JAMA* 1982;248:715-717
- Bliss P, Parsons CA, Blake PR. Incidence and possible aetiological factors in the development of pelvic insufficiency fractures following radical radiotherapy. *Br J Radiol* 1996;69:548-554
- Huh SJ, Kim B, Kang MK, et al. Pelvic insufficiency fracture after pelvic irradiation in uterine cervix cancer. *Gynecol Oncol* 2002;86:264-268
- Konski A, Sowers M. Pelvic fractures following irradiation for endometrial carcinoma. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 1996;35:361-367
- Tai P, Hammond A, Dyk JV, et al. Pelvic fractures following irradiation of endometrial and vaginal cancers—a case series and review of literature. *Radiother Oncol* 2000;56:23-28
- Moreno A, Clemente J, Crespo C, et al. Pelvic insufficiency fractures in patients with pelvic irradiation. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 1999;44:61-66
- Ogino I, Okamoto N, Ono Y, et al. Pelvic insufficiency fractures in postmenopausal woman with advanced cervical cancer treated by radiotherapy. *Radiother Oncol* 2003;68:61-67
- Ikushima H, Osaki K, Furutani S, et al. Pelvic bone complications following radiation therapy of gynecologic malignancies: clinical evaluation of radiation-induced pelvic insufficiency fractures. *Gynecol Oncol* 2006;103:1100-1104
- Baxter NN, Habermann EB, Tepper JE, et al. Risk of pelvic fractures in older women following pelvic irradiation. *JAMA* 2005;294:2587-2593
- Abe H, Nakamura M, Takahashi S, Maruoka S, Ogawa Y, Sakamoto K. Radiation-induced insufficiency fractures of the pelvis: evaluation with 99mTc-methylene diphosphonate scintigraphy. *AJR* 1992;158:599-602
- Blomlie V, Rofstad EK, Talle K, Sundfør K, Winderen M, Lien HH. Incidence of radiation-induced insufficiency fractures of the female pelvis: evaluation with MR imaging. *AJR* 1996;167:1205-1210
- Cooper KL, Beabout JW, Swee RG. Insufficiency fractures of the sacrum. *Radiology* 1985;156:15-20
- Peh WC, Gough AK, Sheeran T, et al. Pelvic insufficiency fractures in rheumatoid arthritis. *Br J Rheumatol* 1993;32:319-324
- Dasgupta B, Shah N, Brown H, et al. Sacral insufficiency fractures: an unsuspected cause of low back pain. *Br J Rheumatol* 1998;37:789-793
- Finiels H, Finiels PJ, Jacquot JM, et al. Fractures of the sacrum caused by bone insufficiency. Meta-analysis of 508 cases. *Presse Med* 1997;26:1568-1573
- Howland WJ, Loeffler RK, Starchman DE, Johnson RG. Postirradiation atrophic changes of bone and related complications. *Radiology* 1975;117:677-685
- Hopewell JW. Radiation-therapy effects on bone density. *Med Pediatr Oncol* 2003;41:208-211
- De Smet AA, Neff JR. Pubic and sacral insufficiency fractures: clinical course and radiologic findings. *AJR* 1985;145:601-606
- Cabarrus MC, Ambekar A, Lu Y, Link TM. MRI and CT of insufficiency fractures of the pelvis and the proximal femur. *AJR* 2008;191:995-1001
- Small W Jr, Kachnic L. Postradiotherapy pelvic fractures: cause for concern or opportunity for future research? *JAMA* 2005;294:2635-2637
- Jenkins PJ, Montefiore DJ, Arnott SJ. Hip complications following chemoradiotherapy. *Clin Oncol (R Coll Radiol)* 1995;7:123-126
- Bragg DG, Shidnia H, Chu FC, Higinbotham NL. The clinical and radiographic aspects of radiation osteitis. *Radiology* 1970;97:103-111
- Fu AL, Greven KM, Maruyama Y. Radiation osteitis and insufficiency fractures after pelvic irradiation for gynecologic malignancies. *Am J Clin Oncol* 1994;17:248-254
- Schneider R, Yacovone J, Ghelman B. Unsuspected sacral fractures: detection by radionuclide bone scanning. *AJR* 1985;144:337-341
- Peh WC, Khong PL, Sham JS, Ho WY, Yeung HW. Sacral and pubic insufficiency fractures after irradiation of gynaecological malignancies. *Clin Oncol (R Coll Radiol)* 1995;7:117-122
- Emami B, Lyman J, Brown A, et al. Tolerance of normal tissue to therapeutic irradiation. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 1991;21:109-122

32. **Small W Jr, Mell LK, Anderson P, et al.** Consensus guidelines for delineation of clinical target volume for intensity-modulated pelvic radiotherapy in postoperative treatment of endometrial and cervical cancer. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 2008;71:428-434
33. **Guise TA.** Bone loss and fracture risk associated with cancer therapy. *Oncologist* 2006;11:1121-1131
34. **Shaker JL, Fallon MD, Goldfarb S, et al.** WR-2721 reduces bone loss after hind limb tenotomy in rats. *J Bone Miner Res* 1989;4:885-890
35. **Feltl D, Vosmik M, Jirasek M, Stahalova V, Kubes J.** Symptomatic osteoradionecrosis of pelvic bones in patients with gynecological malignancies-result of a long-term follow-up. *Int J Gynecol Cancer* 2006;16:478-483
36. **Wong JK, Wood RE, McLean M.** Conservative management of osteoradionecrosis. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 1997;84:16-21
37. **Liu SH, Chang JT, Ng SH, Chan SC, Yen TC.** False positive fluorine-18 fluorodeoxy-D-glucose positron emission tomography finding caused by osteoradionecrosis in a nasopharyngeal carcinoma patient. *Br J Radiol* 2004;77:257-260
38. **Hung GU, Tsai SC, Lin WY.** Extraordinarily high F-18 FDG uptake caused by radiation necrosis in a patient with nasopharyngeal carcinoma. *Clin Nucl Med* 2005;30:558-559
39. **Bui QC, Lieber M, Withers HR, Corson K, van Rijnsoever M, Elsaleh H.** The efficacy of hyperbaric oxygen therapy in the treatment of radiation-induced late side effects. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 2004;60:871-878
40. **Abbas AA, Yoon TR, Lee JH, Hur CI.** Posttraumatic avascular necrosis of the femoral head in teenagers treated by a modified transtrochanteric rotational osteotomy: a report of three cases. *J Orthop Trauma* 2008;22:63-69
41. **Tani N, Oka S, Hayakawa S, Kitabayashi Y, Fukui K.** A case report of male alcoholics treated the left replacement prosthesis on account of the idiopathic avascular necrosis of the left femoral head. *Nihon Arukoru Yakubutsu Igakkai Zasshi* 1999;34:173-182
42. **Bekler H, Uygur AM, Gokce A, Beyzadeoglu T.** The effect of steroid use on the pathogenesis of avascular necrosis of the femoral head: an animal model. *Acta Orthop Traumatol Turc* 2007;41:58-63
43. **Dhadda AS, Chan S.** Bilateral avascular necrosis of the hips after chemoradiotherapy for cervical cancer. *Clin Oncol (R Coll Radiol)* 2006;18:576-577
44. **Kyung HS, Kim SY, Oh CW, Kim YG.** Osteonecrosis of the femoral head and acetabulum following radiation therapy: difficult case in diagnosis and treatment: a case report. *J Korean Orthop Assoc* 1998;33:934-940
45. **Kerachian MA, Harvey EJ, Cournoyer D, Chow TY, Seguin C.** Avascular necrosis of the femoral head: vascular hypotheses. *Endothelium* 2006;13:237-244
46. **Grigsby PW, Roberts HL, Perez CA.** Femoral neck fracture following groin irradiation. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 1995;32:63-67
47. **Bluemke DA, Zerhouni EA.** MRI of avascular necrosis of bone. *Top Magn Reson Imaging* 1996;8:231-246
48. **Boice JD Jr, Engholm G, Kleinerman RA, et al.** Radiation dose and second cancer risk in patients treated for cancer of the cervix. *Radiat Res* 1988;116:3-55
49. **Arai T, Nakano T, Fukuhisa K, et al.** Second cancer after radiation therapy for cancer of the uterine cervix. *Cancer* 1991;67:398-405
50. **Tountas AA, Fornasier VL, Harwood AR, et al.** Postirradiation sarcoma of bone: a perspective. *Cancer* 1979;43:182-187
51. **Nakanishi K, Yoshikawa H, Ueda T, et al.** Postradiation sarcomas of the pelvis after treatment for uterine cervical cancer: review of the CT and MR findings of five cases. *Skeletal Radiol* 2001;30:132-137
52. **Sheppard DG, Libshitz HI.** Post-radiation sarcomas: a review of the clinical and imaging features in 63 cases. *Clin Radiol* 2001;56:22-29
53. **Cahan WG, Woodard HQ, Higinbotham NL, et al.** Sarcoma arising in irradiated bone: report of eleven cases. *Cancer* 1948;1:3-29
54. **Huvos AG, Woodard HQ, Cahan WG, et al.** Postradiation osteogenic sarcoma of bone and soft tissues. a clinicopathologic study of 66 patients. *Cancer* 1985;55:1244-1255
55. **Sundaresan N, Huvos AG, Krol G, et al.** Postradiation sarcoma involving the spine. *Neurosurgery* 1986;18:721-724
56. **Weatherby RP, Dahlin DC, Ivins JC.** Postradiation sarcoma of bone: review of 78 Mayo Clinic cases. *Mayo Clin Proc* 1981;56:294-306

Abstract

Post Pelvic Radiotherapy Bony Changes

Seung Jae Huh, M.D.

Department of Radiation Oncology, Samsung Medical Center,
Sungkyunkwan University School of Medicine, Seoul, Korea

There has been recent interest in radiation-induced bone injury in clinical conditions, especially for pelvic insufficiency fracture (PIF). A PIF is caused by the effect of normal or physiological stress on bone with demineralization and decreased elastic resistance. Pelvic radiotherapy (RT) can also contribute to the development of a PIF. A PIF has been regarded as a rare complication with the use of megavoltage equipment. However, recent studies have reported the incidence of PIFs as 8.2~20% after pelvic RT in gynecological patients, an incidence that was higher than previously believed. The importance of understanding a PIF lies in the potential for misdiagnosis as a bony metastasis. If patients complain of pelvic pain after whole-pelvis radiation therapy, the presence of a PIF must be considered in the differential diagnosis. The use of multibeam arrangements and conformal RT to reduce the volume and dose of irradiated pelvic bone can be helpful to minimize the risk of fracture. In addition to a PIF, osteonecrosis and avascular necrosis of the femoral head can develop after radiation therapy. Osteoradionecrosis of the pelvic bone is a clinical diagnostic challenge that must be differentiated from an osseous metastasis. A post-radiation bone sarcoma can result as a long-term sequela of pelvic irradiation for uterine cervical cancer.

Key Words: Pelvic insufficiency fracture, Osteoradionecrosis, Post-radiotherapy osteosarcoma